

MEDICOVER PÁCIENS TÁJÉKOZTATÓ

MINTAVÉTEL SZÉKLET VÉR (HUMÁN HEMOGLOBIN) VIZSGÁLATHOZ



A vizsgálat a vastagbélrák szűrésére legtöbbet alkalmazott teszt, kimutatja, hogy van-e humán-specifikus vér a székletben. Ha kevés vér kerül a székletbe, az szemmel nem látható, ezért laboratóriumi vizsgálat szükséges a vérzés igazolására.

A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát a laboratóriumban leadni. A minta addig szobahőmérsékleten tárolható.

Menstruáció alatt ne történjen mintavétel!

Mintagyűjtés módja:

1. A mintavételi csőre vezesse rá a következő információkat:

- név
- mintavétel dátuma

2. Helyezzen WC papírt a WC csészébe.

3. Közvetlenül a vécépapírra székeljen, vigyázva, hogy a széklet ne érintkezzen vízzel vagy vizeletteslivel

4. Cavarja le a mintagyűjtő zöld kupakját. Ne rázza fejjel lefelé a csövet. **Ne nyissa ki az átlátszó kupakot!**

5. A zöld kupakhoz csatlakoztatott pálca rovátkolt részét dugja a székletbe, egymás után 4 különböző helyre.

6. A székletnek a pálca rovátkolt részét fednie kell az ábrán látható módon:



Ne gyűjtsön be túl sok székletet!

7. Helyezze vissza a zöld kupakot, és csavarja rá erősen. Ne nyissa ki újra. Finoman rázza meg a csövet.

8. A mintagyűjtő eszköz fénytől védve tartandó. Ha a mintavétel napján nem tudja eljuttatni a széklet mintát a laborba, akkor a minta szobahőmérsékleten 2-3 napig tárolható.



SAMPLING FOR FAECAL BLOOD (HUMAN HEMOGLOBIN) TEST

The test is most often used for colon cancer screening, showing whether there is human-specific blood in the stool. If a small amount of blood gets into the stool, it is not visible to the naked eye, therefore a laboratory test is necessary to confirm the bleeding.

Please return the sample to the laboratory within 24 hours of sampling. Until then, the sample can be stored at room temperature.

Do not take a sample during menstruation!

Method of sample collection:

1. Write the following information on the sampling tube:

- name
- date of sampling

2. Place toilet paper in the toilet bowl.

3. Defecate directly on the toilet paper; do not let the stool come in contact with water or urine.

4. Unscrew the green cap of the sample collector.

Do not shake the tube upside down.

Do not open the transparent cap!

5. Insert the striated part of the stick attached to the green cap into the stool in 4 different places.

6. The stool must cover the striated part of the stick as shown in the figure:



Do not collect too much stool!



Green cap
Transparent cap

7. Replace the green cap and screw it on tightly. Do not open it again. Gently shake the tube.

8. Keep the sample collection device protected from light. If you cannot deliver the stool sample to the laboratory on the day of sampling, then the sample can be stored at room temperature for 2-3 days.

