




MINTAVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZÉKLET PANCREAS SPECIFIKUS ELASZTÁZ VIZSGÁLATHOZ

Ez a teszt a székletmintában található, hasnyálmirigy által termelt elasztáz 1 enzim mennyiségét méri és elégtelen emésztőenzim termeléssel járó hasnyálmirigy betegségek diagnosztizálására használható. A pancreas elasztáz 1 az emésztőrendszeren sértetlenül halad keresztül, ennek köszönhetően lehetőség van a székletből történő fájdalommentes enzimszint meghatározásra.

A széklet pancreas elasztáz vizsgálat, már az enyhe fokú hasnyálmirigy elégtelenséget (gyulladás, tumor, diabetes) is ki tudja mutatni.

1. Vegye ki a speciális széklettartályt a dobozából és a védőtasakból. A tartály végén lévő fület fordítsa el ütközésig.
2. Húzza ki széklettartályból a piros, közepén lyukas dugón keresztül a mintavevő pálcát. A közepén lyukas piros dugó maradjon a csőben, ezt nem kell kivennie.
3. A mintavevő pálcát egymás után négy helyre, 1-1 cm mélyre szúrja bele a székletbe úgy, hogy a pálcát végén az apró rovátkák köze megteljen széklettel.
4. Ellenőrizze, hogy a pálcát végén lévő rovátkák között kitölti-e a széklet. A vizsgálathoz pontosan a rovátkák között maradó székletmennyiség kell. A székletbe csak a pálcát kell beleszúrni, nem kell a csőbe székletet tenni! A vizsgálat nem végezhető, ha több, vagy kevesebb széklet minta kerül a pálcát recés végére.



A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát a laboratóriumunkban leadni. A minta addig szobahőn tárolható.

A hasmenéses széklet esetén a vizsgálat nem végezhető el. Menstruáció alatt ne történjen széklet-vizsgálat.




FECAL SAMPLING FOR PANCREATIC ELASTASE I EXAMINATION



The test measures the amount of elastase I enzyme, produced by the pancreas, within the feces. It is used for the diagnosis of pancreatic diseases resulting from the inadequate digestive enzyme production.

Pancreatic elastase I passes through the digestive system intact, so that painless determination of its level within the stool can be carried out. The pancreatic elastase I content of the stool can show the degree of pancreatic insufficiency (inflammation, tumor, diabetes).

1. Unwrap the special fecal container from its box and its safety packet. Turn the white handle at the end of the container counterclockwise to unlock the sampling rod. Please leave the red plug intact.
2. Pull out the sampling rod from the container through the red central-hollow plug. The red plug must remain inside the container, do not pull it out.
3. Insert the white sampling rod 1 cm deep at four different parts of the stool.
4. Make sure that all four grooves of the comb-like tip are filled with the stool. Please try to remove any additional sample that is outside the grooves. What remains within the four grooves is the sufficient amount of sample for the test. Please do not place any more sample inside the container. The test will be faulty if there are too much or too little sample.



Please hand in the sample at one of our facilities within 24 hours after sample collection. In the meantime, the sample can be stored at room temperature.

Diarrheal feces are not eligible for the examination.

Do not take sample during the menstrual period.

